

「2026. 07. 03」

农业气象周报

研究员：张昕

期货从业资格号F03109641

期货投资咨询从业证Z0018451

联系电话：0595-86778969

关注我们获取
更多资讯



业务咨询
添加客服



目录



1、周度重点气象



2、各农作物产区气象


「周度重点关注气象」

- ◆ 国内方面，东北地区降雨利于土壤墒情，但低洼农田渍涝风险较高。西北、华北南部、黄淮及内蒙古西部等地高温天气，不利于棉花、玉米、大豆等作物生长。华南和西南地区强降水天气易导致早稻、玉米、等在地作物受淹和根系早衰。南疆高温天气不利于棉花开花、红枣果实膨大，以及甜菜等作物生长。
- ◆ 国际方面，美豆大豆处于生长期，截至6月28日，大豆开花率19%，五年平均为15%，结荚率4%，五年同期平均2%。优良率65%，较前一周下降1%。未来6-10天，美国大豆产区温度高于正常；降水量方面，降雨高于常值。南美大豆收获活动结束。加拿大油菜籽播种基本完成，进入生长期。未来15天加拿大三大省份油菜籽关键产南部地区多数降雨低于常值，中部地区降雨高于常值；气温正常或偏高。降雨有利于土壤墒情。欧洲油菜籽处于收获期，未来15天欧洲关键产区降雨低于常值；气温高于常值。高温少雨增加干旱风险，影响油菜籽结实，但利于收割，油菜籽产量预估有下调。印尼和马来西亚降雨较多，正常或低于常值，对棕榈果采摘影响一般。
- ◆ 6月至8月、7月至9月、8月至10月、9月至11月厄尔尼诺概率100%。

「大豆周度气象分析」

各产区生长期

图 大豆主产区



东北地区（含内蒙古）大豆产量超总产量60%。处于苗期至分枝期

黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）大豆产量占总产量15%以上。出于苗期

来源：重点农产品市场信息平台


图 未来10天全国降水量预报

5

「大豆周度气象分析」

气温——黄淮地区气温偏高，影响大豆生长

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度	目前温度及影响
东北产区	苗期至分支期	条件适宜
黄淮海产区	苗期	气温偏高，不利于大豆生长

「大豆周度气象分析」

美国大豆主产区及生长期

图 美国大豆主产区



美国大豆产区集中在中部，包括爱荷华州、伊利诺斯州、明尼苏达州、内布拉斯达州、印第安纳州等。

截至6月28日，大豆开花率19%，五年平均为15%，结荚率4%，五年同期平均2%。优良率65%，较前一周下降1%


美国农业部供需报告显示：2026/27年度美国大豆产量12070万吨，低于上年度11599万吨。

来源：USDA

「大豆周度气象分析」


温度、降水量——气温高于常值，降雨高于常值

图 气温前瞻



来源: NOAA

图 降水量前瞻




来源: NOAA

未来6-10天，美国大豆产区温度高于正常；降水量方面，降雨高于常值。

「大豆周度气象分析」


美国干旱监测——干旱情况持续改善，但情况差于去年

图 美国干旱监测



来源：USDA

图 美国大豆产区干旱程度




来源：USDA

6月30日当周美国干旱监测报告报告显示，大豆产区约19%（-3%）区域处于干旱状态，和上周对比，严重干旱及以上区域（D2+）-3%、D3+区域-1%，D4+区域+0%，总体来说严重干旱区域情况变化有改善。和去年同期对比，D1+区域增加11%，D2+区域增加8%，D3+区域增加4%，情况差于去年同期。

巴西大豆主产区及生长期

图 巴西大豆主产区



巴西大豆产区集中在中西部，在马托格罗索州（28%）、巴拉那州（13%）、南里奥格兰德州（11%）、戈亚斯州（11%）、南马托格罗索州（9%）。

巴西2025/26年度大豆收获活动结束。


美国农业部报告预估2026/27年度巴西大豆产量1.86亿吨，较上一年度增加0.06亿吨。

来源：USDA

「大豆周度气象分析」


降水量、温度——降雨低于常值，利于收割

图 巴西未来15天降水距平（%）



来源：世界农业展望局

图3、 巴西未来15天温度距平（°F）




来源：世界农业展望局

未来15天，巴西中西部大豆产区降雨低于常值；气温正常或高于常值。天气利于收割的收尾活动。

「大豆周度气象分析」

阿根廷大豆主产区及生长期

图 阿根廷大豆主产区



阿根廷大豆产区集中在中部，布宜诺斯艾利斯省（31%）、科尔多瓦省（28%）、圣菲省（19%）、圣地亚哥-德尔埃斯特罗省（9%）。约占世界产量的12%。

2026年阿根廷大豆收获结束。


美国农业部预计2026/27年度产量5000万吨，同比减少6.08%。

来源：USDA

降水量、温度——多数地区降雨低于常值，有利于收获

图 阿根廷未来15天降水距平（%）


Forecast Precipitation (percent of normal)
Soybeans Production Shown Inset
15-Day Forecast (GFS) Beginning 16 June 2026



来源：世界农业展望局

图3、 阿根廷未来15天温度距平（°F）

Forecast Temperature (departure from normal, °F)
Soybeans Production Shown Inset
15-Day Forecast (GFS) Beginning 16 June 2026




来源：世界农业展望局

未来15天，阿根廷大豆产区多数地区降雨低于常值，北部地区降雨高于常值。气温正常或低于常值。天气有利于收获收尾活动

「油菜籽周度气象分析」

各产区生长期

图 油菜籽主产区



西北、华北地区种植春油菜，油菜籽产量约占总产量10%，现蕾抽噎至开花期。

长江中下游地区种植冬油菜，油菜籽产量约占总产量50%，收获结束。

西南地区种植冬油菜，油菜籽产量占总产量35%以上，收获结束。

来源：重点农产品市场信息平台

「油菜籽周度气象分析」

降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
西北、华北产区 (10%，春)	现蕾抽噎至开花期	条件适宜
长江中下游产区 (50%，冬)	收获结束	
西南产区 (35%，冬)	收获结束	

「油菜籽周度气象分析」

气温——条件适宜

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
西北、华北产区 (10%，春)	现蕾抽噎至开花期	条件适宜
长江中下游产区 (50%，冬)	收获结束	
西南产区 (35%，冬)	收获结束	

「油菜籽月度气象分析」

加拿大菜籽主产区及生长期

图 加拿大菜籽主产区



加拿大油菜籽产量全球第一，约占全球22%。加拿大菜籽集中在草原三省（阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省、曼尼托巴省）种植。一般5月开始播种。

截至 2026 年 6 月下旬，加拿大油菜籽播种基本结完成，大部分作物进入生长旺季。


加拿大统计局公布了2026年作物播种面积预估数据,菜籽播种面积预计为2184万英亩,较去年增长1%。

来源: USDA

「油菜籽周度气象分析」


温度、降水量——降雨分布不均，气温正常或偏高

图 未来15天降水距平 (%)



来源：世界农业展望局

图 未来15天温度距平




来源：世界农业展望局

未来15天加拿大三大省份油菜籽关键产南部地区多数降雨低于常值，中部地区降雨高于常值；气温正常或偏高。降雨有利于土壤墒情。

「油菜籽月度气象分析」

欧盟菜籽主产区及生长期

图 欧盟菜籽主产区



欧盟油菜籽产量全球第二，约占全球20%。

欧盟的油菜种植区域主要分布在法国（21%）、德国（21%）、波兰（18%）、罗马尼亚（6%）等国。

油菜处于收获期。


欧盟委员会 预测，2026/27年度油菜籽产量1980万吨，较上月预测下调105万吨，同比减少1.8%。美国农业部预估2026/27年度欧盟油菜籽产量预计为2050万吨。

来源：USDA

「油菜籽周度气象分析」


温度、降水量——关键产区降雨低于常值，气温偏高

图 未来15天降水距平 (%)



来源：世界农业展望局

图 未来15天温度距平




来源：世界农业展望局

未来15天欧洲关键产区降雨低于常值；气温高于常值。高温少雨增加干旱风险，影响油菜籽结实，但利于收割

「 棕榈油周度气象分析 」

印度尼西亚主产区

图 印度尼西亚棕榈油主产区



印尼棕榈油主产区为苏门答腊岛和加里曼丹岛。

来源：USDA

马来西亚主产区

图 马来西亚棕榈油主产区




来源：MPOB

马来西亚棕榈油产区集中在沙撈越、沙巴、彭亨、柔佛、霹靂五个州，其中沙巴和沙撈越加起来产量超45%。

「棕榈油周度气象分析」


降水量——降雨正常或低于常值

图 东南亚未来一周降水



来源: CPC

图 东南亚未来一周降水距平




来源: CPC

印尼和马来西亚降雨较多，
正常或低于常值，对棕榈果
采摘影响一般

「 棕榈油周度气象分析 」

厄尔尼诺&拉尼娜——6月至11月厄尔尼诺概率100%


图 ENSO预测（6月）



来源：IRI

6月至8月、7月至9月、8月至10月、9月至11月厄尔尼诺概率100%。

图 不同模型对ENSO指数的预测（6月）




来源：IRI

「玉米周度气象分析」

各产区生长期

图 玉米主产区



东北地区（含内蒙古）种植春玉米，产量超总产量40%，春玉米处于苗至穗期。

黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）种植夏玉米，产量占总产量30%以上，春玉米处于苗期至穗期，夏玉米处于苗期。


西南地区玉米产量占总产量10%左右，春玉米处于拔节至乳熟期，夏玉米处于苗期至穗期。

来源：重点农产品市场信息平台

「玉米周度气象分析」

降水量——西南部分地区强降雨，不利于玉米生长

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
东北产区 (40%)	春玉米处于苗期至穗期	降雨有利于土壤墒情， 但低洼农田渍涝风险较高
黄淮海产区 (30%)	春玉米处于苗期至穗期， 夏玉米处于苗期	条件适宜
西南产区 (10%)	春玉米处于拔节至乳熟期， 夏玉米处于苗期至穗期	降雨过多，可能导致农 田短时渍涝，影响玉米 作物生长

「玉米周度气象分析」

气温——黄淮海地区气温偏高，不利于玉米生长

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度	目前温度及影响
东北产区 (40%)	春玉米处于苗期至穗期	条件适宜
黄淮海产区 (30%)	春玉米处于苗期至穗期， 夏玉米处于苗期	气温偏高，不利于玉米 作物生长
西南产区 (10%)	春玉米处于拔节至乳熟期， 夏玉米处于苗期至穗期	条件适宜

「棉花周度气象分析」

各产区生长期

图 棉花主产区



新疆棉花产量约占总产量90%，处于开花盛期。

黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）棉花产量占总产量6%左右，一般4-5月播种。目前处于现蕾至开花期

来源：重点农产品市场信息平台

「棉花周度气象分析」

降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
新疆 (90%)	开花盛期	条件适宜
黄淮海产区 (6%)	现蕾至开花期	条件适宜

「棉花周度气象分析」

气温——气温偏高，不利于棉花开花结铃


图 全国最高气温预报



「苹果周度气象分析」

各产区生长期

图 苹果主产区



渤海湾产区（山东、辽宁、河北、北京、天津）苹果产量约占总产量33%，处于膨大期。

西北黄土高原区（陕西渭北地区、山西晋南和晋中、河南三门峡地区、新疆和甘肃的陇东地区）苹果产量约占总产量60%，处于膨大期。

来源：重点农产品市场信息平台

降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
渤海湾产区 (33%)	膨大期	条件适宜
西北黄土高原 (60%)	膨大期	条件适宜

「苹果周度气象分析」

气温——条件适宜


图 全国最高气温预报



「红枣周度气象分析」

各产区生长期

图 红枣主产区



新疆红枣产量约占总产量50%，一般4月下旬播种。处于果实迅速增长期。

黄土高原区（山西、陕西）红枣产量占总产量20%以上，一般4月下旬播种。处于果实迅速增长期


黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）红枣产量占总产量20%以上，目前枣树处于果实迅速增长期。

来源：重点农产品市场信息平台

「红枣周度气象分析」

降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
新疆 (50%)	处于果实迅速增长期	条件适宜
黄土高原区 (20%)	处于果实迅速增长期	条件适宜
黄淮海产区 (20%)	处于果实迅速增长期	条件适宜

「红枣周度气象分析」

气温——南疆高温天气对红枣果实膨大不利

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
新疆 (50%)	处于果实迅速增长期	南疆高温天气对红枣果实膨大不利
黄土高原区 (20%)	处于果实迅速增长期	条件适宜
黄淮海产区 (20%)	处于果实迅速增长期	条件适宜

「甘蔗周度气象分析」

各产区生长期

图 甘蔗主产区



广西、云南、广东甘蔗产量分别占总产量的68.6%、14.8%、12.6%，处于伸长期。

来源：重点农产品市场信息平台

「甘蔗周度气象分析」

降水量——华南地区降雨较多，低洼农田渍涝灾害的风险高

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
广西 (68.6%)	伸长期	部分地区降雨较多，低洼农田渍涝灾害的风险高
云南 (14.8%)	伸长期	部分地区降雨较多，低洼农田渍涝灾害的风险高
广东 (12.6%)	伸长期	部分地区降雨较多，低洼农田渍涝灾害的风险高

「 甘蔗周度气象分析」

气温——条件适宜

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
广西 (68.6%)	伸长期	条件适宜
云南 (14.8%)	伸长期	条件适宜
广东 (12.6%)	伸长期	条件适宜

「甜菜周度气象分析」

各产区生长期

图 甜菜主产区



新疆甜菜产量约占总产量39%，多为春播，处于叶丛快速生长至块根、糖分增长期。

华北地区甜菜产量约占总产量57%，多为春播，处于叶丛快速生长至块根、糖分增长期。

来源：重点农产品市场信息平台

「甜菜周度气象分析」

降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
新疆 (39%)	叶丛快速生长块根至糖分 增长期	条件适宜
华北产区 (57%)	叶丛快速生长块根至糖分 增长期	条件适宜

「甜菜周度气象分析」

气温——新疆气温偏高，不利于作物生长

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
新疆 (39%)	叶丛快速生长块根至糖分 增长期	气温偏高，不利于作物 生长
华北产区 (57%)	叶丛快速生长块根至糖分 增长期	条件适宜

「花生周度气象分析」

各产区生长期

图 花生主产区



东北地区花生产量约占总产量10%，春花生处于开花下针期。

黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）花生产量占总产量60%以上，目前春花生处于开花下针至结荚期，夏花生处于幼苗期。

华南产区花生产量占总产量10%以上，目前春花生饱果成熟期，秋花生收获结束。

来源：重点农产品市场信息平台

「花生周度气象分析」

降水量——华南部分地区降雨较多，低洼农田渍涝灾害的风险高

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
东北产区 (10%)	春花生处于开花下针期	低洼农田渍涝灾害的风险高
黄淮海产区 (60%)	目前春花生处于开花下针至结荚期，夏花生处于幼苗期	条件适宜
华南产区 (10%)	春花生饱果成熟期	部分地区降雨较多，低洼农田渍涝灾害的风险高

「花生周度气象分析」

气温——条件适宜

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
东北产区 (10%，春)	春花生处于幼苗期	条件适宜
黄淮海产区 (60%)	春花生处于开花下针期， 夏花生处于幼苗期。	条件适宜
华南产区 (10%)	春花生结荚期	条件适宜

各产区生长期

图 小麦主产区



西北地区小麦产量约占总产量10%以上，主要种植春小麦，春小麦处于开花至乳熟期，冬小麦处于收获期。

黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）小麦产量占总产量80%以上，主要种植冬小麦。冬小麦处于收获期。

来源：重点农产品市场信息平台

降水量——降雨影响收晒

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
西北产区 (10%，春)	春小麦处于开花至乳熟期， 冬小麦处于收获期	条件适宜
黄淮海产区 (80%，冬)	冬小麦处于收获期	降雨影响收晒

「小麦周度气象分析」

温度——条件适宜

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
西北产区 (10%，春)	春小麦处于开花至乳熟期， 冬小麦处于收获期	条件适宜
黄淮海产区 (80%，冬)	冬小麦处于收获期	条件适宜

「 稻谷周度气象分析」

各产区生长期

图 稻谷主产区



东北地区种植粳稻，一年一季，产量约占总产量20%，一季稻处于分蘖期。

长江中下游地区单双季稻并存，产量占总产量40%以上，早稻抽穗期。一季稻处于分蘖期，晚稻处于收获结束。

西南地区以单季两熟稻为主，粳、粳稻并存，产量约占总产量14%，一季稻处于分蘖至拔节期。

华南地区种植双季籼稻，一年多熟，产量约占总产量12.5%，早稻处于灌浆期，晚稻收获结束

来源：重点农产品市场信息平台

「 稻谷周度气象分析」

降水量——强降雨令水稻受淹和根系早衰

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
东北 (20%)	一季稻处于分蘖期	条件适宜
长江中下游 (40%)	早稻抽穗期。一季稻处于分蘖期	强降雨令早稻受淹和根系早衰
西南 (14%)	一季稻处于分蘖至拔节期	强降雨令水稻受淹和根系早衰
华南 (12.5%)	早稻处于灌浆期	强降雨令早稻受淹和根系早衰

「 稻谷周度气象分析」

气温——条件适宜

图 全国最高气温预报



来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
东北 (20%)	一季稻处于分蘖期	气温偏低
长江中下游 (40%)	早稻抽穗期。一季稻处于分蘖期	条件适宜
西南 (14%)	一季稻处于分蘖至拔节期	条件适宜
华南 (12.5%)	早稻处于灌浆期	条件适宜

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

瑞达期货研究院简介

瑞达期货股份有限公司创建于1993年，目前在全国设立40多家分支机构，覆盖全国主要经济地区，是国内大型全牌照期货公司之一，是目前国内拥有分支机构多、运行规范、管理先进的专业期货经营机构。2012年12月完成股份制改制工作，并于2019年9月5日成功在深圳证券交易所挂牌上市，成为深交所期货第一股、是第二家登陆A股的期货上市公司。

研究院拥有完善的报告体系，除针对客户的个性化需要提供的投资报告和套利、套保操作方案外，还有晨会纪要、品种日评、周报、月报等策略分析报告。研究院现有特色产品有短信通、套利通、市场资金追踪、持仓分析系统、投顾策略、交易诊断系统、数据管理系统以及金发服务体系专供策略产品等。在创新业务方面，积极参与创新业务的前期产品研究，为创新业务培养大量专业人员，成为公司的信息数据中心、产品策略中心和人才储备中心。

瑞达期货研究院将继往开来，向更深更广的投资领域推进，为客户的期货投资奉上贴心、专业、高效的优质服务。